

**Пересмотренные критерии СКВ 1982 года Американского Колледжа Ревматизма  
(Arthritis Rheum 1982; 25:1271-1277)**

1. Симптом волчаночной бабочки
2. Дискоидные поражения кожи
3. Фоточувствительность
4. Безболезненные изъязвления во рту или носоглотке
5. Неэрозивный артрит 2 и более суставов
6. Серозит(плеврит/перикардит)
7. Поражение почек (протеинурия >0.5г/л или цилиндрурия)
8. Поражения ЦНС (судороги или психоз)
9. Гематологические проявления (гемолитическая анемия с ретикулоцитозом, лейко/лимфо/тромбоцитопения)
10. Результаты иммунологических исследований\* ( LE-клетки, анти дсДНК, анти Sm, ложно положительная реакция Вассермана)
11. Антинуклеарные антитела

---

Предложенная классификация основывается на 11 критериях, для постановки диагноза СКВ требуется наличие (одновременно либо последовательно) 4 из перечисленных 11 критериев.

\* - Спектр иммунологических исследований с 1982 года значительно изменился – в качестве специфических иммунологических тестов при СКВ можно рекомендовать обнаружение антител к дсДНК, антител к Sm антигену, изолированное обнаружение антител к SS-A 60 кДа, антител к рибосомальному белку Р, антител к антигену пролиферирующих клеток (PCNA), антикардиолипиновых антител классов IgG и IgM, волчаночный антикоагулянт и антитела к бета2-ГП I